

## Läs mer om MULTAQ® i bipacksedeln som kommer med förpackningen eller på [www.fass.se](http://www.fass.se)

Rådgör alltid med din läkare om du har frågor eller upplever förändringar i hur du mår.

MULTAQ® ingår i högkostnadsskyddet med följande begränsning: Endast som tillägg till standardbehandling, vanligen inkluderande betablockerande och blodförtunnande läkemedel, för patienter med icke-permanent förmaksflimmer som har minst en av följande kardiovaskulära riskfaktorer:

- Tidigare stroke eller TIA
- Hypertoni
- Diabetes
- Hög ålder, över 75 år

MULTAQ® (dronedaron), 400 mg, filmdragerad tablett. Receptbelagt läkemedel. Indikation: MULTAQ används om du har förmaksflimmer, det vill säga episoder då ditt hjärta slår fort och oregelbundet. Du ska inte använda MULTAQ om ditt förmaksflimmer är kroniskt, det vill säga pågår hela tiden. MULTAQ minskar risken för förmaksflimmerepisoder. Behandlingen med MULTAQ bör skötas av läkare med erfarenhet av behandling av hjärtsjukdomar. Dosering: MULTAQ ges som tablett à 400 mg två gånger dagligen. Det är mycket viktigt att MULTAQ tas i samband med måltid. Ta en tablett tillsammans med frukosten och en tablett tillsammans med kvällsmåltiden. Varningar och försiktighet: När du medicinerar med MULTAQ skall du informera din läkare om du får svullna underben, svårigheter att andas när du ligger ner eller sover, blir andfådd när du rör dig eller ökar i vikt (vilka är tecken och symtom på hjärtsvikt). Informera din läkare omedelbart om du får smärtor eller obehagskänslor i magen, aptitförlust, illamående, kräkningar, gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot), onormalt mörk urin, trötthet (speciellt i samband med andra symtom som anges ovan), klåda, eller om du blir andfådd eller får torrhosta. Datum för senaste översyn av produktresumé: juni 2020. För ytterligare information, se [www.fass.se](http://www.fass.se)

Kontaktuppgifter: MULTAQ tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00, [www.sanofi.se](http://www.sanofi.se). Vid frågor om våra läkemedel kontakta: [infoavd@sanofi.com](mailto:infoavd@sanofi.com).

Läs bipacksedeln noga före användning.

**Till dig  
som behandlas med  
MULTAQ<sup>®</sup> (dronedaron)**

## VAD ÄR FÖRMAKSFLIMMER?

Förmaksflimmer är en störning i hjärtrytmen som kan leda till oregelbunden och snabb hjärtverksamhet. Det är en vanlig rytmstörning och över 180 000 svenskar beräknas ha förmaksflimmer. Sjukdomen kan leda till flera olika symtom och ibland till allvarliga hjärt- och kärlkomplikationer.

## VARFÖR HAR DU BLIVIT ORDINERAD MULTAQ®?

MULTAQ® innehåller den aktiva substansen dronedaron och används om du har eller har haft episoder med förmaksflimmer.

## VAD ÄR MULTAQ®?

MULTAQ® är ett receptbelagt läkemedel som hjälper till att kontrollera hjärtats rytm och frekvens. MULTAQ® minskar också risken för att du behöver akut sjukhusvård till följd av ditt förmaksflimmer.

## HAR MULTAQ® NÅGRA BIVERKNINGAR?

Liksom alla läkemedel kan även MULTAQ® orsaka biverkningar. Vanliga biverkningar (påverkar 1–10 av 100 patienter) vid behandling med MULTAQ® är problem med matsmältningen, illamående, kräkningar eller diarré. Vissa patienter upplever även trötthet. Var uppmärksam på eventuella biverkningar och prata med din läkare om du upplever något som du tror är onormalt.

## NÄR SKA JAG TA MULTAQ®?

Det är mycket viktigt att MULTAQ® tas med måltid, eftersom viss del av effekten går förlorad om läkemedlet tas på fastande mage. Ta den ena MULTAQ® 400 mg-tabletten till frukost och den andra till kvällsmålet. Avsluta inte behandlingen med MULTAQ® utan att rådgöra med din läkare, även om du har mått bra en längre tid eller att du upplever att läkemedlet inte har avsedd effekt eller att du får besvärande biverkningar.

## HUR SKA JAG TA MULTAQ®?

Svälj tabletten hel med vatten och alltid i samband med måltid. Om du glömmet en dos ska du vänta och ta nästa dos i vanlig tid. Ta inte två doser på en gång. Försök inte ersätta en glömd dos.

## NÄR SKA JAG BÖRJA TA MIN NYA MEDICIN?

Börja ta MULTAQ® enligt läkarens föreskrifter och följ rekommenderade kontroller.

## VAD SKA JAG GÖRA OM JAG KÄNNER AV MITT FLIMMER IGEN?

Återfall i förmaksflimmer ska inte nödvändigtvis ses som ett behandlingsmisslyckande, rådgör alltid med din behandlande läkare innan du avslutar behandlingen. De långsiktiga behandlingsmålen är att lindra symtomen, att minska risken för följsjukdomar samt att minska behovet av akut sjukhusvård till följd av förmaksflimret.

## VAD BÖR JAG INTE TA TILLSAMMANS MED MULTAQ®?

MULTAQ® påverkar vissa läkemedel negativt, vilket kan orsaka allvarliga biverkningar. Det är viktigt att du talar om för din läkare vilka andra läkemedel du använder – inklusive naturmedel. Ta inte MULTAQ® tillsammans med grapefruktjuice eller johannesört.

## VEM BÖR INTE ANVÄNDA MULTAQ®?

MULTAQ® ska inte användas:

- Om du har en typ av oregelbunden hjärtrytm som kallas permanent förmaksflimmer. Vid permanent förmaksflimmer har flimret funnits under lång tid (under minst 6 månader) och beslut har tagits att inte återställa din hjärtrytm till normal rytm med hjälp av konvertering.
- Om du har eller har haft problem där ditt hjärta inte kan pumpa runt blodet i kroppen så bra som det borde (hjärtsvikt). Symtom på hjärtsvikt kan vara:
  - andnöd vid fysisk belastning
  - nattlig andnöd eller andnöd i liggande ställning
  - vätskeansamling i kroppen

MULTAQ® kan i sällsynta fall ge upphov till leverskada. Var därför uppmärksam på följande symtom: nyligen uppkommen ihållande buksmärta, anorexi, illamående, kräkningar, feber, sjukdomskänsla, trötthet, gulсот, mörk urin eller klåda.

Om du tar MULTAQ® och upplever att du har något av dessa symtom, kontakta omedelbart din behandlande läkare.